

รายชื่อยาที่ห้ามบดหรือทำให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร

ลำดับ	ชื่อการค้า	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เหตุผลที่ห้ามบดหรือทำให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร
1	Actonel	Risedronate	Tablet	เพิ่มโอกาสของการเกิดแผลในหลอดอาหาร โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นั่งไม่ได้
2	Aggrenox	Dipyridamole + Acetylsalicylic acid	Modified-release capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
3	Alkeran	Melphalan	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
4	Arimidex	Anastrozole	Tablet	ตัวยาอยู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
5	Augmentin	Amoxicillin / Clavulanic acid	Tablet	เหนียวเมื่อบด เสื่อมสภาพเมื่อชื้น
6	Cardura XL	Doxazosin	Controlled-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
7	Casodex	Bicalutamide	Tablet	ตัวยาอยู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
8	Cellcept	Mycophenolate mofetil	capsule	ตัวยามีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
9	Clarinase	Loratadine + pseudoephedrine	Repetab	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
10	Concerta	Methylphenidate	Extended-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
11	Cymbalta	Duloxetine	Hard gastro-resistant capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
12	Cytotec	Misoprostol	Tablet	ตัวยาอยู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
13	Depakine chrono	Sodium valproate	Sustained-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
14	Diamicron MR	Gliclazide	Modified-release tablet	ปริมาณยาถูกปลดปล่อยทั้งหมดทีเดียว เมื่อบดหรือทำให้แตก จึงไม่สามารถคุมอาการของโรคได้ทั้งวัน
15	Dilantin Kapseal	Phenytoin	Extended-release capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ

ลำดับ	ชื่อการค้า	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เหตุผลที่ห้ามบดหรือทำให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร
16	Dilem SR	Diltiazem	Sustained-release capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
17	Ectopal	Danazol	capsule	ตัวยาอยู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
18	Endoxan	Cyclophosphamide	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
19	Efexor-XR	Venlafaxine	Extended-release capsule	ปริมาณยาถูกปลดปล่อยทั้งหมดทีเดียว เมื่อบดหรือทำให้แตก จึงไม่สามารถคุม อาการของโรคได้ทั้งวัน
20	Fosamax	Alendronate	Tablet	เพิ่มโอกาสของการเกิดแผลใน หลอดอาหารโดยเฉพาะผู้ป่วยที่นั่งไม่ได้
21	Gaszym	Pancreatin + simethicone	two phase coated tablet	ตัวยาถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร
22	Harnal	Tamsulosin	Sustained-release capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
23	Hydrea	Hydroxyurea	capsule	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
24	Imuran	Azathioprine	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
25	Invega	Paliperidone	Extended-release Tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
26	Isordil SL	Isosorbide dinitrate	Sublingual tablet	ตัวยาสูดซับที่ลิ้นเมื่อกลืน
27	Kapanol	Morphine 20, 50	Sustained-release capsule	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
28	Klacid MR	Clarithromycin	Modified-release tablet	ปริมาณยาถูกปลดปล่อยทั้งหมดทีเดียว เมื่อบดหรือทำให้แตก จึงไม่ได้ระดับยาที่ คงที่ตามระยะเวลาที่ต้องการ
29	Lastet	Etoposide	capsule	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
30	Leukeran	Chlorambucil	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
31	Methotrexate	Methotrexate	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา ตัวยาอยู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
32	Miracid	Omeprazole	Capsule of enteric- coated pellets	ตัวยาถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร

ลำดับ	ชื่อการค้า	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เหตุผลที่ห้ามบดหรือทำให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร
33	Morphine retard	Morphine 10	Extended-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
34	Natrilix SR	Indapamide	Sustained-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
35	Nexium MUPS*	Esomeprazole	Tablet of enteric-coated multiple unit pellet system	ตัวยากถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร
36	Norflex	Orphenadrine	Slow-release tablet	ตัวยาระคายผนังกระเพาะอาหาร
37	Nuelin SR	Theophylline	Sustained-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
38	Ova-mit	Clomifene	Tablet	ตัวยายู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
39	Pariet *	Rabeprazole	Tablet of enteric-coated multiple unit pellet system	ตัวยากถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร
40	Plendil	felodipine	Extended-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
41	Prevacid FDT *	Lansoprazole	Fast Disintegrating tablet of enteric-coated granules	ตัวยากถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร
42	Proscar	Finasteride	Tablet	ตัวยายู่ใน pregnancy risk category X เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยาที่กำลังตั้งครรภ์
43	Quomem	Bupropion	Sustained-release tablet	ปริมาณยาถูกปลดปล่อยทั้งหมดทีเดียว เมื่อบดหรือทำให้แตก จึงไม่ได้ระดับยาที่ คงที่ตามระยะเวลาที่ต้องการ
44	Salazopyrin EN	Sulfasalazine	Enteric-coated tablet	ตัวยาระคายผนังกระเพาะอาหาร
45	Seroquel XR	Quetiapine	Extended-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
46	Serrin	Serratiopeptidase	Enteric-coated tablet	ตัวยากถูกทำลายด้วยกรดน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร
47	Trivastal retard 50	Piribedil	Sustained-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
48	Ufur	Tegafur + Uracil	Capsule	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เสี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา

ลำดับ	ชื่อการค้า	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เหตุผลที่ห้ามบดหรือทำให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร
49	Vastarel MR	Trimetazidine	Modified-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
50	Xatral XL	Alfuzosin	Extended-release tablet	ปริมาณยาสูงมากเมื่อบดหรือทำให้แตก อาจเกิดพิษ
51	Xeloda	Capecitabine	Tablet	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เลี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา
52	Zavedos	Idarubicin	Capsule	ตัวยามีพิษต่อเซลล์ เลี่ยงต่อผู้เตรียม/ป้อนยา

หมายเหตุ

รายการยาที่สามารถหักแบ่งหรือแกะแคปซูลออกได้ แต่ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก

Efexor แกะแคปซูลออก และนำผงยามาละลายน้ำ 15-30 มล. และให้ทาง NG tube

Miracid กรณีปลายสายอยู่ที่กระเพาะอาหารควรผสมแกรนูลกับน้ำผลไม้ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด
เช่น น้ำแอปเปิ้ล น้ำส้ม และ flush สายด้วยน้ำผลไม้หลังให้ยา